



# ANESTHÉSIE GÉNÉRALE DE L'ENFANT EN RADIOTHÉRAPIE

## FICHE D'INFORMATION

**Votre enfant doit être traité par radiothérapie externe à l'ICANS. Le traitement sera réalisé sous anesthésie générale. Aussi, nous tenons à vous rappeler quelques consignes essentielles pour le bon déroulement des séances.**

### CONSIGNES AVANT

#### LE DÉBUT DE LA SÉANCE

Votre enfant doit impérativement être à jeûn avant chaque anesthésie générale, ce qui implique que le dernier repas doit être terminé 6 heures avant le début de la séance. Votre enfant est cependant autorisé à boire des liquides clairs jusqu'à 2h avant le début de la séance.

Par liquide clair, on entend uniquement : eau plate sucrée ou non, sirop, tisane, jus de raisin ou de pomme transparent.

Les boissons lactées, le lait, les produits contenant des particules ainsi que les boissons gazeuses sont exclus.

Le volume total que votre enfant peut boire sera précisé par le médecin anesthésiste. Par exemple, si la séance est prévue à 14h, l'enfant doit avoir terminé son petit déjeuner à 8h et est autorisé à boire des liquides clairs jusqu'à midi.

Si l'enfant est alimenté par sonde gastrique, pompe d'alimentation (DRIP) sera arrêtée 6h auparavant.

### CONSIGNES CONCERNANT

#### L'HABILLEMENT

De préférence, mettre des vêtements amples et faciles à enlever, idéalement t-shirt et gilet boutonné à l'avant.

Il peut être utile de prévoir une tenue de rechange et des couches. Les doudous, tétines, CD sont bienvenus.

### L'ANESTHÉSISTE VOUS VERRA

#### SYSTÉMATIQUEMENT AVANT

#### CHAQUE SÉANCE

**Il est important de lui signaler tout événement inhabituel même s'il vous paraît banal : vomissement, toux, fièvre, problèmes cutanés...**

Sauf cas particulier, la présence des parents lors de l'endormissement et du réveil est bienvenue.

À l'issue de la séance, l'enfant est transféré dans la salle de réveil où il est surveillé.

Il pourra manger et boire rapidement avec l'accord du médecin-anesthésiste.

Une collation est prévue mais vous pouvez aussi lui apporter des aliments qu'il aime.

Un micro-onde est à disposition dans le service.

**Le départ est autorisé par le médecin anesthésiste, 20 à 30 min après le repas si l'enfant va bien.**

**Si le retour à domicile se fait en voiture privée, deux adultes doivent être présents pendant le trajet.**

<b>SCANNER</b>	<b>Le petit-déjeuner doit être IMPÉRATIVEMENT TERMINÉ À</b>	<b>Votre enfant peut boire 1 seule fois un verre de ..... ml d'eau, eau sucré, jus de pomme ou raisin transparent **</b>
<b>11h30</b>	Pas de petit déjeuner Si alimentation par DRIP arrêt à 5h30	De 5h30 jusqu'à 9h30
<b>13h30</b>	7h30	De 7h30 jusqu'à 11h30
<b>14h</b>	8h	De 8h jusqu'à 12h
<b>14h30</b>	8h30	De 8h30 jusqu'à 12h30
<b>15h</b>	9h	De 9h jusqu'à 13h
<b>15h30</b>	9h30	De 9h30 jusqu'à 13h30

\*\* Aucune autre boisson n'est autorisée